

**Bemonsteringsfrequenties**

**1. Slachthuizen**

# geslachte vleeskuikens / jaar*	# basisbemonsteringsbeurten**	# verminderde bemonsteringsbeurten**
>1.000.000	1 beurt / week	1 beurt / 2 weken
>150.000 < of = 1.000.000 ***	1 beurt / maand	1 beurt / 2 maanden
>10.000 < of = 150.000 ***	1 beurt / trimester	niet voor vermindering vatbaar
< of = 10.000 ***	1 beurt / semester	

**2. Uitsnijderijen**


# ton vlees / week	# basisbemonsteringsbeurten**	# verminderde bemonsteringsbeurten**
>10.000 kg	1 beurt / week	1 beurt / 2 weken
< of = 10.000 kg ***	1 beurt / maand	1 beurt / 2 maanden


\* rekening houden met het aantal geslachte dieren in het vorig kalenderjaar en met de omzettingsswaarde: 1 kalkoen=3 vleeskuikens


\*\* 1 bemonsteringsbeurt = 5 monsters van 26 g of van 35 g

\*\*\* om over te gaan naar de versoepelde frequentie(s), dienen eerst de voorwaarden vermeld onder punt 5.3.2. van omzendbrief PCCB/S3/823823 te zijn nageleefd.


 basisfrequentie                       verminderde basisfrequentie  
 versoepelde frequentie                       versoepelde en verminderde frequentie

 aanpassing van de bemonsteringsfrequentie na toereikende resultaten gedurende 30 opeenvolgende weken voor Salmonella en na 52 opeenvolgende weken voor Campylobacter

 aanpassing van de bemonsteringsfrequentie na toereikende resultaten gedurende 10 opeenvolgende bemonsteringsbeurten

 aanpassing van de bemonsteringsfrequentie in geval ontoereikende resultaten zijn bekomen

Een aanpassing (frequentieverlaging) bedoeld door een bovenliggende pijl (groen of geel op rood) geeft aan hoe de aanpassing (frequentieverhoging) bedoeld door de onderliggende pijl (rood) ongedaan wordt gemaakt.

 geen verdere verhoging indien nieuwe ontoereikende resultaten zijn bekomen na verhoging van trimestriële of semestriële bemonsteringen tot maandelijks bemonsteringen