


Държави, засегнати от АЧС в Европа



Карта на районите, в които има АЧС по домашните свине и/или дивите прасета (положение към 26/06/2024 г.).

Германия:



последното огнище при домашни свине е от 5 юни 2024 г.



последният случай при дива прасета е от 25 юни 2024 г.



свиневъди

Африканската чума по свинете продължава своето разпространение в Европа! Нека се борим заедно!

Африканската чума по свинете (АЧС) е силно заразно вирусно заболяване по домашните свине и дивите прасета.

През 2018 г. болестта прескочи повече от 1000 км, за да зарази дива прасета в южната част на Белгия. След 1 година борба и с цената на огромни усилия, и милиони похарчени €, Белгия успя да изкорени АЧС от своята територия. Оттогава болестта продължава да се разпространява в Европа и сега е само на около 200 км от нашите граници! Рискът от повторната ѝ поява е много голям и опасността е реална за Белгия!

Като свиневъд сте длъжни да вземете всички необходими мерки, за да предотвратите появата на болестта във вашето стопанство!

В цялата страна трябва да предприемате необходимите действия, а именно:

1. Да съобщавате за всяко подозрение директно на вашия ветеринарен лекар;
2. Стриктно да спазвате мерките за хигиена и биосигурност във вашето стопанство;
3. Да проверявате всеки, който влиза или работи във вашето стопанство;
4. Да извършвате задължителната годишна оценка на биосигурността с вашия ветеринарен лекар и да изпълнявате плана за действие.

Всички мерки, които трябва да се спазват, могат да се видят на адрес:

<https://favv-afsc.be/fr/themes/animaux/sante-animale/maladies-animales/peste-porcine-africaine>



fasfc

Federal Agency for the Safety of the Food Chain

.be



fasfc

Federal Agency for the Safety of the Food Chain

.be

Заболяването

АЧС е **силно заразно** вирусно заболяване, което може да засегне **домашните свине** и **дивите прасета**. Няма типични симптоми на АЧС.

Всяка необичайна смъртност трябва да доведе до съмнение за АЧС.

Заболяването може да се прояви в 3 форми:

остра форма:

- висока **температура**, анорексия, диария;
- летаргия, **склонност на прасетата за струпване едно върху друго**;
- хематологични заболявания, придружени от **подкожни кръвоизливи и жълтеница**;
- бърза смърт (2-3 седмици) и висок процент на **смъртност**, който се приближава до 100%.

по-лека форма: по-слаби симптоми, по-ниска смъртност и настъпване на смърт за по-дълъг период.

хронична форма: по-слабо изразени признаци на заболяването, които се развиват в продължение на няколко месеца, като например:

- аборти, малки приплоди, прасенца със забавено развитие;
- слаба ефективност при угодяване.



Source : FLI



Rougeurs cutanées
Source : JM Gourreau

Основни пътища на предаване

АЧС може да се предава чрез:

- **контакт със заразени домашни свине или диви прасета** (включително трупове или вътрешности);
- **месо/месни изделия** от заразени животни;
- **замърсени предмети**, като например обувки, дрехи, превозни средства, оборудване;
- **хора**, които са имали контакт със заразени животни или са били на заразени места.

Вирусът остава заразен дълго време в мъртвите животни, в околната среда и в месото/месните изделия от заразени животни (до 105 дни във вътрешности и кръв и до 300 дни в изсушено месо!).

АЧС не се предава на хората.
Няма никакъв риск за човешкото здраве.

3 стълба за борба с АЧС

Превенция

Няма ваксина (все още) срещу АЧС. Единственият начин да се предотврати проникването на болестта в стопанството е да се прилагат мерки за хигиена и биосигурност*, като например:

- използване на хигиенен въздушен шлюз;
- наличие на програма за борба с вредителите;
- спазване на хигиенните мерки за всяко лице, влизащо във фермата;
- поставяне под карантина на новите прасета;
- недопускане на хранене на прасетата с кухненски отпадъци;
- предотвратяване на контакта между домашните свине и диви прасета;
- забрана на достъпа до стопанството на всяко лице, превозно средство или оборудване, което е било в контакт с диви прасета или е било в рисковата зона през последните 72 часа;
- тези мерки е особено важно да се спазват, когато се наемат хора, които идват от или са пребивавали в рисковата зона (сезонни работници);
- за прасета с открит двор:
 - да се осигури двойна ограда, за да се предотврати контакт с диви прасета;
 - да се поставят знаци, предупреждаващи минувачите, че храненето на прасета е забранено.

*Не се колебайте да се запознаете с контролните точки, определени за одита на биосигурността:

https://favv-afscab.be/sites/default/files/2023-11/20210531_circ_instructionveterinairesanalysederisque_FR_v1.pdf

Ранно откриване

Винаги се свързвайте с ветеринарния си лекар, когато забележите симптоми, подсказващи АЧС, или наблюдавате необичайна смъртност.

Винаги е по-добре да се изследва дори прекалено често, отколкото недостатъчно!

Борба със заразата

Няма лечение за АЧС. Борбата със заразата се осъществява основно чрез избиване на животните и ограничаване на тяхното местене и движение.

Предприетите мерки имат за цел да изолират огнището възможно най-бързо, за да се попречи на разпространението на заразата и да се ликвидира вирусът. Тези мерки са определени от законодателството на ЕС и включват:

- избиване на всички свине в огнището и унищожаване на труповете им;
- почистване и дезинфекциране на заразения стопанство;
- създаване на ограничителни зони около огнището на заразата, в които движението на животни, хора и стоки е забранено или ограничено.

